





	Localisation	Symptômes	Signes cliniques
	Cerveau	Déficiência cognitive	Déficits d'attention, de raisonnement, de fonctions exécutives
		Sensoriels (hémicorps) et moteurs	Signes du motoneurone supérieur
		Affectifs (principalement dépressifs)	
		Épilepsie (rare)	
		Displasie corticale focale (rare)	
	Nerf optique	Perte de vision unilatérale douloureuse	Scotome, réduction de l'acuité visuelle, de la perception de la couleur, déficit pupillaire afférent relatif.
	Cervelet et voies cérébelleuses	Tremblements	Tremblements posturaux ou d'action, dysarthrie
		Maladresse, troubles de l'équilibre	Incoordination des membres, démarche ataxique
	Tronc cérébral	Diplopie, oscillopsie,	Nystagmus, ophtalmoplégie internucléaire ou autre
		Vertiges	
		Troubles de l'élocution et de la déglutition	Dysarthrie et paralysie pseudo-bulbaire
		Symptômes paroxystiques	
	Moelle épinière	Faiblesse musculaire	Signes du motoneurone supérieur
		Raideurs et spasmes douloureux	Spasticité
		Troubles de la vessie	
		Troubles de l'érection	
		Constipation	
	Autres	Douleurs	
		Fatigue	
		Sensibilité à la chaleur et intolérance à l'exercice	